

# เมื่อถูกสุนัข กัด ช่วน เลียบาดแผล **ต้องรีบ**



**ล้างแผล** ด้วยสบู่และ  
น้ำสะอาดอย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



**ใส่ยา** เบตาดีน



**กักหมา** ไว้ดูอาการ 10 วัน



**หาหมอ** เพื่อรับการป้องกัน  
ที่ถูกต้อง และมาตามนัดทุกครั้ง

**ถูกสุนัขกัด  
ต้องล้างแผล ใส่ยา  
กักหมา หาหมอ  
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด**

## คำแนะนำ

**ฉีดวัคซีน** ป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

**ทำหมัน** ไม่ให้  
มีลูกมากเกินไป

เลี้ยงในรั้วบ้าน  
**ระวัง!** อย่าให้  
ไปกัดคนอื่น



## กาตา 5 ย กับสุนัขกัด



**อย่า  
แพ้ย** ให้สุนัขโมโท



**อย่า  
เหยียบ** หาง หัว ตัว ขา  
ให้สุนัขตกใจ



**อย่า  
แยก** สุนัขที่กัดกัน  
ด้วยมือเปล่า



**อย่า  
หยิบ** อาหารที่สุนัข  
กำลังกิน



**อย่า  
ยุ่ง** กับสุนัขที่ไม่รู้จัก  
หรือไม่มีเจ้าของ



**โรคพิษสุนัขบ้า  
อันตรายถึงตาย  
หากไม่ได้ฉีดวัคซีน**



# โรคพิษสุนัขบ้า



เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
เกิดจากเชื้อเรบีสไวรัส เป็นได้  
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



## แต่ !!

สัตว์นำโรคที่สำคัญ คือ



สุนัข



แมว

## ! กลุ่มเสี่ยง

คนที่ถูกหมากัด ข่วน  
เลียบาดแผล แล้วไม่ไป  
ฉีดวัคซีน



## การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด ข่วน เลียบาดแผล



## ดูอย่างไร ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก



นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด  
เก็บตัว ทวาดระแวง



ระยะต้นต้น



กระวนกระวาย กัดไม่เลือก  
เท่าหอน



ระยะอัมพาต



น้ำลายไหล คางห้อยตก  
ล้มลง ตาย



## ความรู้ที่มักเข้าใจผิด



- สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
- สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



- โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้วรักษาให้หายได้
- โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว “รักษาไม่หาย ตายทุกราย”